

דף נוסחאות - טריגונומטריה

גיא רוטנברג - <http://www.sikumuna.co.il>

סיקומונה - אתר הסיכומים החופשי

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

נוסחאות החיבור

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

נוסחאות ההפרדה

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

נוסחאות להורדת מעלה

$$2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha$$

$$2 \cos^2 \alpha = 1 + \cos 2\alpha$$

זהויות יסוד

$$\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\tan \alpha = \cot(90^\circ + \alpha)$$

$$\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$$

$$\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \cot \alpha$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

סכום והפרש זוויתות

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

זווית כפולה

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

חצי זווית

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \\ \tan \alpha &= \frac{1}{\sqrt{t}}\end{aligned}$$

זהויות שימושיות

$$\begin{aligned}\tan \alpha + \tan \beta &= \tan(\alpha + \beta)(1 - \tan \alpha \tan \beta) \\ \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

פתרונות משוואות

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin y \\ &\Downarrow \\ x = y + 360^\circ k &\text{ or } x = 180^\circ - y + 360^\circ k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \\ \cos 3\alpha &= 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha\end{aligned}$$

זוויות משולשת

$$\cos x = \cos y$$


↓

$$x = 360^\circ k \pm y$$

$$\tan x = \tan y$$

↓

$$x = y + 180^\circ k$$



הציגת הפונקציות הטריגונומטריות על ידי פונ-
קציה טריגונומטרית אחת

הציגה באמצעות סינוס -

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{\sqrt{1-t^2}}{t} \\ \tan \alpha &= \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \\ \cot \alpha &= \frac{\sqrt{1-t^2}}{t}\end{aligned}$$

הציגה באמצעות קוסינוס -

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{\sqrt{1-t^2}}{t} \\ \tan \alpha &= \frac{\sqrt{1-t^2}}{t} \\ \cot \alpha &= \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}\end{aligned}$$

הציגה באמצעות טנגנס -

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \\ \cos \alpha &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \\ \cot \alpha &= \frac{1}{t}\end{aligned}$$

הציגה באמצעות קוטנגנס -

$$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$$

משפט הקוסינוסים

במשולש שאורך צלעותיו a, b, c והזווית שמול צלע a
היא α מתקיים

$$\begin{aligned} M &= \pi Rl \\ S &= \pi R^2 \\ P &= S + M \\ V &= \frac{Sh}{3} \\ l^2 &= R^2 + h^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \end{aligned}$$

משפט הסינוסים

אם r הוא הרדיוס של המעגל החוסם את המשולש אז
מתקיים

גליל

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$

$$\begin{aligned} S &= \pi R^2 \\ p &= 2\pi R \\ M &= ph \\ P &= M + 2S \\ V &= \frac{Sh}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{ab \sin \gamma}{2} = \frac{bc \sin \alpha}{2} = \frac{ac \sin \beta}{2} \\ S &= \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma} \\ S &= 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \end{aligned}$$

מנסrah ישרה**הנדסת המרחב**

$$V = Sh$$

- h גובה
- S שטח הבסיס
- V נפח
- M שטח המעלפת
- P שטח פנים
- p היקף בסיס
- R רדיוס
- l הקו היוצר

פרמידה ישרה

$$\begin{aligned} P &= S + M \\ V &= \frac{Sh}{3} \end{aligned}$$